Параллельная вычислительная технология многомасштабной модели атмосферы ПЛАВ и результаты ее применения

Толстых М.А.^{1,2,3,4}, Фадеев Р.Ю.^{1,2,3}, Гойман Г.С.^{1,3,2}, Зарипов Р.Б.²,
Шашкин В.В.^{1,2,3}, Мизяк В.Г.²,
Рогутов В.С.², Алипова К.А.^{2,1}, Бирючева Е.О.²

1 - ИВМ РАН, 2 - Гидрометцентр России, 3 - МФТИ, 4 - МГУ имени М.В.Ломоносова

e-mail: rost.fadeev@gmail.com

29 сентября 2025

Суперкомпьютерные дни в России

Глобальная модель атмосферы ПЛАВ

- Совместная разработка ИВМ РАН и Гидрометцентра России.
- Применяется в Гидрометцентре для оперативного среднесрочного и долгосрочного прогнозов погоды.
- Одна из 10 оригинальных глобальных моделей прогноза погоды в мире
- Результаты разработчиков ПЛАВ вошли в Топ-10 научных открытий российских ученых в 2022 году (по версии РНФ).
- С 2024 г Гидрометцентр – один из 5 глобальных продуцирующих центров ВМО по субсезонному прогнозу.

The screenshot shows the website for the WMO Lead Centre for Sub-seasonal Prediction Multi-Model Ensemble. At the top, there are logos for the World Meteorological Organization and the Hydrometeorological Centre of Russia. The main heading is "WMO Lead Centre for Sub-seasonal Prediction Multi-Model Ensemble". Below this, there is a paragraph describing the center's role in coordinating multi-model ensembles. There are two buttons: "FORECAST CHARTS" and "VERIFICATION STATISTICS". Below the buttons, there is a link for further information. The section "Global producing centre for Sub-Seasonal Predictions (GPC-SSP)" lists five centers: Beijing, Brazil, ECMWF, Moscow, and Tokyo. Below this, there is a paragraph about the GPC-SSP's commitment to data exchange. The "Contributing centres" section lists three centers: Exeter, Montreal, and Toulouse, with their respective logos.

Исследования проводятся при поддержке грантов РНФ 25-17-00314, 21-17-00254, 21-71-30023.

Прогностические технологии Гидрометцентра России

наукастинг

Применение модели ПЛАВ в Гидрометцентре России в 2025г.

ПЛАВ10

Среднесрочный (от 3 до 14 суток).

0.1° по долготe, 0.08-0.13° по широте, 104 уровня (3600x1945x104). Детерминированный прогноз.

15 мин на 2916 ядрах — время расчета одного прогноза.

Принята ЦМКП 29.05.2023 г.

ПЛАВ20

Ансамблевый среднесрочный (до 14 суток).

0.225° по долготe, 0.16°-0.24° по широте, 51 уровень (1600x865x51). 36 участников ансамбля.

6 мин на 256 ядрах — время расчета 1 члена анс.

Принята ЦМКП 03.06.2025 г., идет внедрение

ПЛАВ072L96

Субсезонный (2-6 недель) и **сезонный** (1-4 мес.).

0.9° по долготe, 0.72° по широте, 96 уровней (400x250x96). 41 член ансамбля.

Расчет на 123 дня 1 члена анс. - 81 мин. на 128 ядрах.

Сезонный прогноз: принята ЦМКП 22.11.2023 г.

ПЛАВ

- Конечно-разностный полунеявный полулагранжев блок решения уравнений динамики атмосферы (Tolstykh, et al, 2017).
- Набор параметризаций процессов подсеточного масштаба ALADIN/ALARO с рядом модификаций.
- Блоки расчета коротко- и длинноволновой радиации CLIRAD SW + RRTMG LW.
- Модель деятельного слоя суши ИВМ РАН –НИВЦ МГУ, параметризация неорографического ГВС: адаптированные и доработанные версии из модели климата ИВМ РАН.
- Модифицированные параметризации: глубокая конвекция, влияние осадков на турбулентные процессы и др.
- Новые параметризации: учет угла наклона подсеточной орографии в параметризации ОГВС, подынверсионная облачность, расчет температуры морского льда, ледники (опытный режим).

Усовершенствование ПЛАВ072L96

Конфигурация модели: 0.9x0.72, 96 уровней, шаг по времени – 1440 с.

Описание распространения радиации в атмосфере:

Clirad – коротковолновая часть спектра.

Уравнение переноса радиации в двухпоточковом приближении дельта-Эддингтона; 11 спектральных диапазонов; перекрытие облаков: бинарное или предвычисленное (в предположении максимального перекрытия в пределах трех ярусов).

Rrtmglw – длинноволновая часть спектра.

Интерполяция табличных данных, рассчитанных для всех линий поглощения с учетом фактической температуры и давления; 16 спектральных интервалов; перекрытие облаков: максимальное, максимально-случайное, экспоненциальное, максимально-случайное или бинарное.

ecCKD - блок описания распространения радиации (оптимизированный rrtmg).

Tegen, MacV2, CAMS – климатология аэрозолей.

Поток скрытого
тепла на
поверхности.

ПЛАВ 2025
Clirad+rrtmglw
MacV2

ecCKD
CAMS

ПЛАВ 2025

Clirad+rrtmglw

ecCKD

MacV2

CAMS

Осредненная за 4 сезона ошибка (rmse) долгосрочного прогноза на 4 месяца.

Организация вычислений в ПЛАВ

На сетке разрешаются крупномасштабная циркуляция воздушных масс. Вклад процессов подсеточного масштаба учитывается в правой части прогностических уравнений:

$$\frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t} + \mathcal{A}\vec{\varphi} + \mathbf{B}\vec{\varphi} = \vec{\mathbf{F}},$$

В каждой ячейке с учетом типа поверхности моделируются остальные процессы. Цикл по узлам в модели устроен следующим образом:

```
Do i,j
  Do k
    Call deep_convection()
    Call radiative_transfer()
    Call PBL()
  End do
End do
```

ПЛАВ 2025

Clirad+rrtmglw

MacV2

ecCKD

CAMS

Ускорение вычислений за счет перехода на ecckd:

ПЛАВ072L96,	0.9x0.72, 96lvl	– 21%
ПЛАВ20,	0.225x0.16-0.24, 51 lvl	– 23%
ПЛАВ10,	0.1x0.08-0.13, 104 lvl	– 21 %

ПЛАВ072L96

Субсезонный (2-6 недель) и **сезонный** (1-4 мес.).

0.9°x0.72°, 96 уровней.

41 член ансамбля.

Расчет на 123 дня 1 члена ансамбля - 81 мин.

на 128 ядрах (67 мин. в эксп. версии).

Прогноз аномалии приземной температуры по ПЛАВ072L96

Moscow: 2m temperature weekly mean anomalies

Base time: Thu 12 Jun 2025 Valid time: Mon 23 Jun 2025 - Mon 30 Jun 2025 (+432h) Area : Eurasia

Прогноз на 23-30.06.2025 от 12.06.2025

© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: www.ecmwf.int
Created at 2025-06-22T18:57:21.934Z

Мультимодельный
прогноз аномалии
приземной температуры

Customized Multi-Model: 2m temperature weekly mean anomalies

Base time: Thu 12 Jun 2025 Valid time: Mon 23 Jun 2025 - Mon 30 Jun 2025 (+432h) Models combination : cma,cptec,eccc,ecmwf,hmcr,jma,kma,metfr,ncep,ukmo Area : Eurasia

Прогноз аномалии приземной температуры по ПЛАВ072L96

Moscow: 2m temperature weekly mean anomalies

Base time: Thu 26 Jun 2025 Valid time: Mon 30 Jun 2025 - Mon 07 Jul 2025 (+264h) Area : Eurasia

Прогноз на 30.06-07.07.2025 от 26.06.2025

Мультимодельный
прогноз аномалии
приземной температуры

Customized Multi-Model: 2m temperature weekly mean anomalies

Base time: Thu 26 Jun 2025 Valid time: Mon 30 Jun 2025 - Mon 07 Jul 2025 (+264h) Models combination : eccc,ecmwf,hmcr,jma,kma,metfr,ncep,ukmo Eurasia

© 2025 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Source: www.ecmwf.int
Created at 2025-07-02T14:59:55.521Z

<https://charts.ecmwf.int/wmo>

Прогноз аномалии приземной температуры по ПЛАВ072L96

Прогноз аномалии приземной температуры на первую неделю октября от 18.09.2025 по ПЛАВ072L96

Moscow: 2m temperature weekly mean anomalies

Base time: Thu 18 Sep 2025 Valid time: Mon 29 Sep 2025 - Mon 06 Oct 2025 (+432h) Area : Eurasia

Детерминированный среднесрочный прогноз ПЛАВ10

Конфигурация модели: 0.1° по долготе , 0.08-0.13° по широте, 104 уровня., шаг по времени – 170 с.

- Впервые достигнут среднемировой уровень по пространственному разрешению (около 10 км).
- Прошла опер. испытания, внедрена в 10.2023г.
- Существенные улучшения в тропиках по сравнению с ПЛАВ20, менее заметные в средних широтах.
- Выходная продукция:
 - синоптики (special.meteoinfo.ru);
 - для авиационных прогнозов (после создания постпроцессинга);
 - МЧС;
 - Росатом (Севморпуть).

Корреляция аномалий (АСС)

Изменение ссаф в ПЛАВ10 по отношению к ПЛАВ20
в среднем за октябрь-декабрь 2024

RMSE

Изменение СКО в ПЛАВ10 по отношению к ПЛАВ20
в среднем за октябрь-декабрь 2024

Технология прогноза на основе ПЛАВ

Технология прогноза на основе ПЛАВ

Идентификатор модели	ПЛАВ072L96	ПЛАВ20	ПЛАВ10
Число узлов по долготе	400 (0.9°)	1600 (0.225°)	3600 (0.1°)
Число узлов по широте	251 (0.72°)	865	1945
Число уровней по вертикали	96	51	104
Шаг по времени, с.	1440	450	270
Число шагов по времени в сутки	60	192	320
Размер файла с контрольной точкой, Гб.	0.3	2.8	22.7
Размер сжатого файла с контрольной точкой, Гб.	0.3	1.9	9.9
Размер файла с выходной продукцией, Гб,	-	0.7	3.3

Особенности работы с файловой системой

Асинхронная запись данных с использованием внешних делегатов:

```
aprun \  
-n 4 -d 8 -N 4 ./pario post : \  
-n 4 -d 8 -N 4 ./pario ctrp : \  
-n 216 -d 4 -N 8 --mpmd-env OMP_NUM_THREADS=4 ./slm20L51v.exe \  
2024 01 30 00 > $cdir/slm$slmid.out
```

Существенное ускорение модели за счет сравнительно небольшого (2-3%) увеличения объема задействованных вычислительных ресурсов.

Уменьшение времени инициализации модели – оптимизация входных данных.

Заключение

Создана единая модель для трех приложений: детерминистического и ансамблевого среднесрочного прогноза погоды, а также долгосрочного прогноза аномалий погоды.

- В зависимости от конфигурации модель задействует от 128 до 2916 процессорных ядер Cray XC40 ГВЦ Росгидромета.
- Вычислительная эффективность модели повышена за счет внедрения нового блока описания радиационных потоков есскд и оптимизации работы с файловой системой.
- Модель внедрена в Гидрометцентре России.
- Впервые ликвидировано отставание в разрешении модели среднесрочного прогноза.
- Хорошие результаты в субсезонном прогнозе.

Спасибо за внимание!

Ростислав Юрьевич Фадеев

ИВМ РАН, Гидрометцентр России, МФТИ

rost.fadeev@gmail.com

tg: **@rostfa**

Исследования проводятся при поддержке грантов РФФ 25-17-00314,
21-17-00254, 21-71-30023.